



## Verstandige keuzes bij interne geneeskunde



- 1) Prik op de klinische afdeling alleen meer dan twee keer per week bloed als er een indicatie is.**  
Niet meer bloed prikken dan nodig is, levert patiëntvriendelijke zorg op zonder verlies van kwaliteit en veiligheid. Goede afspraken hierover maakt diagnostiek ook een stuk goedkoper.

### Literatuur

1. Specialisten Radboud besparen simpel kosten. Medisch Contact nr 11 – pagina 554-555; 13 maart 2014 (van der Meer en anderen)
2. The impact of peer management on test-ordering behaviour. Eric G Neilson, Kevin B Johnson, S. Trent Rosenbloom et al Ann Intern Med 2004, 141(3):196-204
3. Bloedzonde. Medisch Contact nr 9 – pagina 413; 27 februari 2014 (Marcel Levi)
4. Can physicians change their laboratory test ordering behaviour? A new look at an old issue. Steven A Schroeder. JAMA Intern Med 2013; 173(17):1655-1656
5. Effect of feedback on test ordering behaviour of general practitioners. RAG Winkens, RPTM Grol, ADM Kester, JA Knottnerus. BMJ 304; 1093-1096, 1992
6. Factors contributing to inappropriate ordering of tests in an academic medical department and the effect of an educational feedback. S Miyakis et al. Postgrad Med J 2006;82:823-829
7. Techniques to improve physicians' use of diagnostic tests: a new conceptual framework. Daniel H Solomon et al. JAMA, 1998; 280(23):2020-2027
8. Unnecessary repeat requesting of tests: an audit in a government hospital immunology laboratory. J Kwok and B Jones. BMJ 2005
9. Unnecessary repeat requesting of tests in a university teaching hospital immunology laboratory: an audit. AP Huissoon and SA Carlton. BMJ 2002
10. The landscape of inappropriate laboratory testing: a 15-year meta-analyse. Ming Zhi et al. PLOS One. 2013