



Verstandige keuzes bij interne geneeskunde



8) Vraag bij een invasieve ingreep niet standaard een stollingsonderzoek aan, maar doe dat op geleide van een bloedingsanamnese.

Bij invasieve ingrepen wordt er in het lichaam gebiopteerd of gesneden. Om te onderzoeken of er sprake is van een versterkte bloedingsneiging (hemorragische diathese) is het noodzakelijk eerst de bloedingsaard en -geschiedenis te onderzoeken. Dan wordt bijvoorbeeld navraag gedaan over het voorkomen van door- of nabloeden bij trauma of operaties, andere aandoeningen bijvoorbeeld aan lever of nieren, bloedingsziekten in de familie en medicijngebruik.

Literatuur

1. Screening for the risk for bleeding or thrombosis. Eckman MH, Erban JK, Singh SK, Kao GS. Ann Intern Med 2003; 138:W15-24
2. Sramek A, Eikenboom JC, Briet E, Vandenbroucke JP, Rosendaal FR. Usefulness of patient interview in bleeding disorders. Arch Intern Med 1995;10;155:1409-15
3. Clinical approach to bleeding disorders. In: Hillman R, Ault K, Rinder H, editors. Hematology in clinical practice. 2005:326-33
4. Guidelines on the assessment of bleeding risk prior to surgery or invasive procedures. Chee Y.L., Crawford J.C., Watson H.G., Greaves M. British Journal of Haematology. 2008:496-504