

# Advanced Care planning

gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van (toekomstige) behandeling en over hoe de patiënt (en familie) daarover denken.



# IC-opname en reanimatie besluit



- Haalbaar-, wenselijk-
- Haalbaar-, wenselijk+/ Haalbaar+, wenselijk-
- Haalbaar+, wenselijk+


# Haalbaarheid?

- frail patients and mildly frail patients had an increased risk of hospital mortality compared with patients who were fit (CFS6–9 vs CFS1–3 OR 2.90 [95% CI 2.12–3.97],  $p < 0.0001$ ; CFS4–5 vs CFS1–3 OR 1.64 [1.20–2.25],  $p = 0.0020$ ),
- Co-morbiditeit
- leeftijd



Association between Clinical Frailty Scale score and hospital mortality in adult patients with COVID-19 (COMET): an international, multicentre, retrospective, observational cohort study. Roos Sablerolles et al. Lancet. Published: February 09, 2021 DOI: [https://doi.org/10.1016/S2666-7568\(21\)00006-4](https://doi.org/10.1016/S2666-7568(21)00006-4)  
<https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/24/de-82-jarige-die-zes-weken-ic-overleefde-a4033188>

# Overleving IC naar leeftijd



# Wenselijk?

- Informeren patient, stelt in staat tot mee denken

- Gesprekshulp behandelgrenzen;

Informatie over IC, beademen en reanimeren.

NICE getallen over overleving en uitkomsten.

Vragen welke aanzetten tot denken wat de patient zelf belangrijk vindt.

- Folder is breed inzetbaar (poli, SEH, huisarts, verpleeghuis)

# Vooruitzien is overwinnen

- 30% zou het liefst zijn behandelgrens met zijn poli dokter bespreken
- Poli dokter is goed geïnformeerd en heeft regelmatig langdurige behandelrelatie
- Geeft de patient tijd om erover na te denken.
- Huisarts?

